



藥物成分

劑型

櫃號

Progesterone

口服藥
陰道塞劑

版本：TPE202309／檔號：2023-360

☞ 藥品商品名及含量

優潔通軟膠囊 100 毫克/膠囊、200 毫克/膠囊 (Utrogestan Soft Capsule)

婦安蒙軟膠囊 100 毫克/膠囊、200 毫克/膠囊 (Promone Soft Capsule)

☞ 藥品作用

1. 口服途徑：治療黃體素不足造成的失調症狀、更年期雌激素治療的輔助藥品、因黃體期障礙造成的不孕或習慣性流產。
2. 陰道途徑：因黃體期障礙造成的不孕或習慣性流產。

☞ 服用/使用方式

1. 本藥有兩種給藥途徑，請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量、增加用藥次數或變更改用藥途徑。若不慎忘記，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。
2. 口服途徑給藥：每日標準用量為 200-300 毫克，分一到二次服用，醫師會根據臨床反應調整劑量。
3. 陰道途徑給藥：
 - (1) 每天普通劑量為 200 毫克，分早晚二次由陰道塞入，醫師會根據臨床反應調整劑量。
 - (2) 給藥前請先用肥皂洗淨雙手，每顆軟膠囊必須塞入陰道深處。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是血栓疾病、中風、心肝腎臟疾病、糖尿病、乳房或生殖器官腫瘤、憂鬱症等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是巴

比妥鹽類、抗癲癇藥 phenytoin、特定抗生素 ampicillin、tetracyclines、rifampicin 或利尿劑 spironolactone 等。

3. 口服本藥可能會讓人嗜睡或暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 黃體素可能造成水腫，有癲癇、偏頭痛、氣喘、心臟以及腎臟疾病者，請小心監測。
5. 經由陰道途徑給藥常見副作用為局部刺激反應。如果發生子宮流血，病人應檢查子宮內膜，先確定清楚原因後才能使用本藥。
6. 經由口服途徑給藥常見副作用為經期改變、停經、間歇性出血、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：出現過敏反應(如紅疹、臉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、皮膚或眼睛變黃或血栓或中風相關症狀(如嚴重頭痛、單側肢體無力、說話不清楚、平衡改變、臉部單側下垂、視力模糊或視力急遽變化、手腳異常腫脹)。
8. 本藥不能用來避孕，不能當作避孕藥使用。治療期間如果發生月經沒來，病人應做懷孕檢查。
9. 資料顯示，懷孕開始 4 個月內及可能懷孕之婦人應避免，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
10. 本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。