



藥物成分	劑型	櫃號
Baclofen 5mg	口服藥	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-045		

☞ 藥品商品名及含量

美時倍鬆錠 5 毫克/錠 (Befon Tablets)。
 貝克瓏錠 5 毫克/錠 (Baclospas Tablets)。

☞ 藥品作用

限於脊髓和大腦疾病或損傷引起的肌肉痙攣。

☞ 服用方式

1. 通常成人每日 3 次，每次 1 粒。之後會視症狀增減用量。
2. 此錠劑可在餐前或餐後服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對本品成分及其賦形劑過敏，或是有其他的疾病，特別是過去曾經有癲癇的紀錄。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是降血壓藥物或是中樞神經抑制劑。
3. 本藥可能會讓人嗜睡或暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 腎功能不全者，請主動告知醫師，必要時醫師會調整劑量。
5. 請勿飲用酒類，酒精會增強此藥物的作用。
6. 常見副作用為可能有噁心、頭痛、肌肉無力等現象，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有以下症狀，請立刻就醫：呼吸困難、低血壓、心跳加快。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師；本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。