



藥物成分

劑型

櫃號

Diquafosol

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-163

☞ 藥品商品名及含量

滴舒適點眼液 30 毫克/毫升；5 毫升/瓶 (Diquas ophthalmic solution)

☞ 藥品作用

治療乾性角結膜炎病人之角膜以及結膜上皮損傷。

☞ 使用方式

1. 通常每天給藥 6 次，每次 1 滴。劑量及間隔請依醫師指示，不可自行調整劑量或使用次數。

眼藥水使用步驟



1. 將頭往後仰或平躺，拉開下眼瞼



2. 眼睛朝上看，藥水瓶口朝眼瞼附近眼白處點一滴眼藥水



3. 輕閉雙眼 2-5 分鐘並按壓眼內角鼻淚管處

☞ 注意事項

1. 若要點 2 種以上眼藥水，每種需間隔 5 至 10 分鐘；同時點眼藥水及眼藥膏時，應先點眼藥水，並最少 5 分鐘後再點眼藥膏。
2. 平時放置在陰涼避光處(25°C以下)保存，注意藥袋警語。
3. 眼藥開封後 1 個月未使用完畢即應丟棄，未開封半年後丟棄。若顏色有變化、顆粒/混濁沉澱物，或出現異味，不可再使用。
4. 若有佩戴隱形眼鏡者，點藥前需取下隱形眼鏡，並等待至少 30 分鐘後再戴上。

5. 常見副作用為眼睛刺激/疼痛/搔癢、眼睛有分泌物或有異物感、結膜充血、結膜下出血、視覺不適感、流眼淚、視力模糊、畏光。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏反應(眼瞼炎、蕁麻疹、全身性疹子、臉部水腫、嘴唇腫脹、血管性水腫、支氣管痙攣)等。

7. 目前對胎兒的風險證據不足，但資料顯示動物實驗中沒有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥分泌到母乳的量很少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。