



藥物成分

劑型

櫃號

Lamivudine

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-260

☞ 藥品商品名及含量

速汰滋膜衣錠 150 毫克/錠 (3TC Film Coated Tablet)

☞ 藥品作用

治療成人及兒童之人類免疫缺乏病毒感染。

☞ 服用方式

1. 每日 2 次，每次 1 粒。
2. 建議整顆吞服，除非病人不適合服用錠劑才可磨粉，磨粉後藥品須混和少量固體的食物或液體並儘速服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師、藥師或個管師是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是B型、C型肝炎或肝腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師、藥師或個管師您是否有在服用其他藥物，如：山梨糖醇、抗病毒藥Zidovudine和Emtricitabine、抗生素Trimethoprim/sulfamethoxazole。
3. 常見副作用為噁心、嘔吐、上腹疼痛、腹瀉、皮疹、禿頭、頭痛、關節痛、肌肉病變、疲勞、不適、發燒等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸急促、心跳加快、心跳感覺不正常、感覺非常疲倦或虛弱、非常嚴重的頭暈、深色尿液、嚴重胃部不適或胃痛、淺色大便、皮膚或眼睛發黃、不正常的燒灼感、麻木感或刺痛感。
5. 懷孕等級C，根據懷孕資料庫統計出服用此藥並無提高主要生育缺陷的風險，臨床上使用抗反轉錄病毒藥物來預防孕婦對新生兒產生HIV垂直感染的建議並不受影響。