



藥物成分	劑型	櫃號
Sulfadiazine Silver	外用 藥膏	
版本：TPE202309／檔號：2023-757		

☞ 藥品商品名及含量

燙舒膚乳膏 1% 500 公克 (Silverzine Cream)

灼膚星乳膏 1% 500 公克 (Sulfasil Cream)

欣膚健乳膏 1% 50 公克 (SSD cream)

☞ 藥品作用

具廣泛的抗菌作用，可用於治療或預防因燒、燙傷引起的感染症。

☞ 使用方式

1. 通常每日 1~2 次，適量塗抹於患部。
2. 使用本藥時雙手應維持無菌狀態，塗藥前請先洗淨雙手，於患部徹底清潔後以無菌手套塗敷於患部至完全覆蓋 1.5~2 毫米的厚度。
3. 本藥覆蓋傷口的時間愈長，傷口癒合的效果會愈好，故若因活動或變換姿勢導致本藥被移除時，應重新塗敷或適當以敷料包紮患部，且必須按時清潔換藥。
4. 不建議使用於眼部、口腔、鼻子等部位。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對磺胺類藥物過敏、蠱豆症、肝腎功能不佳之患者。
2. 不建議使用於早產兒和小於 2 個月的新生兒。
3. 常見副作用為皮膚紅疹、搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：極罕見的嚴重皮膚不良反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、出血症狀(出血不止或瘀青、血尿等)、間質性腎炎(尿量減少、高血壓、蛋白尿等)、異常疲倦或虛弱。

臺北市立聯合醫院

5. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。哺乳：本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。