



藥物成分	劑型	櫃號
Doravirine / Lamivudine/ Tenofovir	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-459		

☞ 藥品商品名及含量

達滋克膜衣錠 100/300/300 毫克/錠

Delstrigo Film-coated Tablets

Lamivudine/Tenofovir/Doravirine 100/300/300mg

☞ 藥品作用

用於治療感染第一型人類免疫缺乏病毒(HIV-1)的成年病人

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每日 1 粒。
2. 藥物可空腹或隨餐服用。
3. 請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整藥量或停藥。

☞ 不良反應

暈眩、噁心、腹瀉、頭痛、失眠、做夢異常等。

☞ 注意事項

1. 合併感染 HIV-1 與 HBV 的病人可能會發生 B 型肝炎嚴重急性惡化，因此在使用 Delstrigo 前，都應先檢測是否感染 HBV。
2. 如果出現持續不退或不斷惡化的骨骼疼痛、四肢疼痛、骨折及/或肌肉疼痛或身體虛弱的現象，可能是發生近端腎小管病變的表現，並應立即進行腎功能評估。
3. 若治療期間需使用其他藥物，可能會影響 Delstrigo 的治療效果，請主動告知醫師或諮詢藥師。
4. 藥物治療期間出現持續不退或不斷惡化之骨骼或肌肉症狀的病人，應考慮可能是發生近端腎小管病變導致的續發性低磷酸鹽血症及軟骨病。