



| 藥物成分                               | 劑型  | 櫃號 |
|------------------------------------|-----|----|
| Gimeracil/<br>Oteracil/<br>Tegafur | 口服藥 |    |
| 版本：TPE202309／檔號：2023-765           |     |    |

## ☞ 藥品商品名及含量

愛斯萬膠囊 5.8 毫克/ 19.6 毫克/ 20 毫克/膠囊 (TS-1)

剋伏膠囊 5.8 毫克/ 19.6 毫克/ 20 毫克/膠囊 (Golfer)

## ☞ 藥品作用

本藥品是一抗癌藥物，可減緩或停止您體內癌細胞的生長，主要用於胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌。

## ☞ 服用方式

- 劑量根據體表面積和肝腎功能調整，通常一天 2 次，早、晚飯後，連續給予 28 天後，停藥 14 天，即為一個療程。
- 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

- 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重肝腎功能不良、嚴重骨髓抑制。
- 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗真菌藥 flucytosine、fluoropyrimidine 類抗腫瘤製劑、抗癲癇藥 phenytoin、抗凝血藥 warfarin。
- 服用期間應監測血球數，若要施打疫苗，請詢問醫師/藥師。
- 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感

**冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免自己受傷，並隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。**

5. 常見的副作用有食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦感、血球數減少、肝指數上升、口內炎、色素沉澱、皮疹等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：出現任何感染症狀(如發燒、喉嚨痛等)、吞嚥困難、肝硬化。**
7. 孕婦不可使用，此藥有致畸胎的紀錄，服用本藥物應進行避孕措施，本藥可能會分泌到母乳裡，應中止哺乳。