



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-454		

## ☞ 藥品商品名及含量

亞翠佩膜衣錠

**Atripla (emtricitabine 200 mg / efavirenz 600 mg /  
tenofovir disoproxil fumarate 300 mg/tab)**

## ☞ 藥品作用

合併三種抗病毒藥物組合成一錠，抑制HIV病毒複製，用於治療 HIV 感染。

## ☞ 服用方式

1. 請遵照醫囑服用。本藥為三種成份按照特定劑量形成的複方，不應剝半使用。
2. 建議空腹服用，在睡前服用可以增加中樞神經副作用的耐受度。

## ☞ 不良反應

頭痛、噁心、腸胃不適、腹瀉、疲勞、脂肪移位。若症狀嚴重或是持續時，請通知您的醫師。

## ☞ 注意事項

1. 對本藥或其他藥品過敏者，請務必告訴您的醫師。
2. 服用本藥時應避免飲酒。
3. 請告知醫師您的病史(特別是肝功能異常、腎功能異常)與目前正在服用的藥物。服用本藥期間，若有服用其他藥品的需求時，請務必告知醫師，因為部分藥品可能影響本藥的代謝，而需要調整劑量。
4. 本藥中的 tenofovir disoproxil fumarate 可能造成骨質密度下降，應依照醫囑補充鈣質與維生素 D。
5. 本藥中的 efavirenz 成分可能造成脂肪移，症狀包含腹部

肥胖、水牛肩、臉部變瘦、胸部增大等。若這些症狀造成您的困擾，應與醫師反應。

6. 本藥可能會造成異常行為，若觀察到病人有憂鬱、躁動、自殺意念等異常行為，應盡速就醫。
7. 服用本藥可能造成疲勞、頭暈和嗜睡。在確定本藥對您的影響之前，應避免開車或操作危險機械。
8. 本藥可能引起乳酸中毒和嚴重肝腫大。乳酸中毒的症狀較不具特異性，包含疲勞、肌肉痛、呼吸困難、腹痛、嗜睡，並伴隨血中乳酸濃度升高與酸血症。
9. 若出現過敏反應(如紅疹、蕁麻疹、臉部/嘴唇/喉部腫脹、呼吸困難、黏膜破或疼痛)、肝功能異常症狀(深色尿、異常疲倦、右上腹疼痛、淺色便、皮膚或眼睛變黃)、乳酸中毒症狀(呼吸急促、心跳異常增快、喘不過氣、極度暈眩、肌肉痙攣、腸胃極度不適)、腎功能異常(尿量急劇減少、排尿疼痛、血尿)、憂鬱、自殺意念、異常行為、骨頭疼痛、記憶障礙，請立即就醫。