

藥物成分

劑型

櫃號

**Dextromethorphan/
Glyceryl Guaiacolate/
Ipecac Fluidextract**

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-150

☞ 藥品商品名及含量

息咳液 1 毫克/10 毫克/0.005 毫克 120 毫升/瓶 (Sortuss)

☞ 藥品作用

鎮咳、祛痰。

☞ 使用方式

1. 通常每 4 小時服用 1 次，成人每次 10~20 毫升；6~12 歲兒童每次 6~10 毫升、2~6 歲每次 2~6 毫升。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 服藥期間請勿飲用酒類。
2. 服後可能有思睡、眩暈現象，應避免開車及操作機械。
3. 常見副作用為嗜睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊、噁心、嘔吐、便秘，但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：發疹、搔癢、過敏。