



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Ferric citrate</b>	<b>口服藥</b>	
版本：TPE202309／檔號：2023-462		

## ☞ 藥品商品名及含量

**拿百磷膠囊 (Nephoxil) 為 Ferric citrate 500 mg 膠囊以散裝、排裝包裝。**

## ☞ 藥品作用

適用於控制接受透析治療的成年慢性腎病患者之高磷血症。

## ☞ 服用方式

每日三次，隨餐或餐後立即服用，請遵照醫師處方之用法及劑量服用，未經醫師同意切勿自行調整藥物。使用時需整粒吞服，**不要咀嚼或打開膠囊。**

## ☞ 注意事項

1. 假如您有以下病症，在未與您的醫師確認前，請不要服用本藥品：低血磷症狀的病人、對本藥品內含成份及檸檬酸鐵過敏的病人、鐵代謝異常及鐵過多症狀的病人(例如血色素沉著症)。
2. 若有懷孕、計畫懷孕、哺乳或曾患有腸胃道疾病、對口服含鐵製劑過敏、貧血、心臟疾病、肝臟疾病等相關疾病，請事先告知您的醫師。
3. 與其他藥品併服可能產生藥物交互作用，若服用下列藥品，請務必告知醫師：口服含鋁製劑、口服含鐵補充劑、抗生素(抗生素至少要在服用 **Nephoxil** 二小時前服用)。
4. 服用本藥品時，請勿與茶、咖啡、牛奶一起使用。

## ☞ 其他注意事項

**Nephoxil** 可能導致糞便顏色變深(黑便)、腸胃道不適(便秘、脹氣、腹瀉、腹痛)、鐵質過量(皮膚呈現灰色、疲倦、頭暈、厭食、噁心、嘔吐、頭痛乎急促)。如有以上症狀請聯絡醫藥人員。