

藥物成分

劑型

櫃號

Zaleplon

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-798

## ☞ 藥品商品名及含量

**第一項商品未決標**

**舊商品：(暫)入眠順膠囊 10 毫克/ 膠囊 (Onsleep)**

## ☞ 藥品作用

可用來治療失眠症，主要用於入眠困難型或是短暫失眠患者。

## ☞ 服用方式

1. 請遵照處方使用，勿自行增加藥量、服藥次數或服藥日數。
2. 如果連續服用一段期間之後請遵照醫師指示慢慢減量，突然停藥可能引發戒斷症狀(焦慮、睡不著、易怒)，如有問題請洽詢藥師或醫師。
3. 每天睡前使用，服用後立即就寢。若忘了服藥可入睡則不須喚醒病人服用；於下次服藥時間服用原本劑量即可，不必服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是重症肌無力症、呼吸功能不全、睡眠呼吸暫止症候群、嚴重肝功能不全病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是中樞神經系統抑制劑及 cimetidine、ketoconazole、rifampin、erythromycin、carbamazepine、phenobarbital 等。
3. 本藥物可能會讓人覺得嗜睡、警覺性及協調能力降低，在沒確定此類藥物對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
5. 服藥期間請避免吃大量的葡萄柚(汁)。
6. 服用此類藥物可能出現夢遊行為，若出現夢遊行為應立即

告知醫師。

7. 常見副作用為頭痛、虛弱、嗜睡、失憶、憂鬱、不安、躁、噁心。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
8. 若出現下列症狀時，請盡速就醫：話多、不安、焦慮、亢奮、顫抖、肌肉痙攣、意識不清、癲癇、皮膚或眼球變黃。
9. 懷孕等級 C，不建議處方給孕婦或是授乳婦使用。若女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；如果有其他替代乳品，我們不建議服藥期間哺餵母乳。若您有相關疑問，請詢問您的醫師及藥師。