



藥物成分	劑型	編號
Fursulitiamine/ Vitamin B₂	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-775		

☞ 藥品商品名及含量

合力他命 F50 糖衣錠 50 毫克/5 毫克 (Alinamin-F50 tab)
愛樂康糖衣錠 50 毫克/5 毫克 (Aelocon S.C. tab)

☞ 藥品作用

神經炎、維生素 B1 缺乏諸症、神經痛、術後腸管麻痺、眼睛疲勞、神經性膀胱炎

☞ 服用方式

1. 成人一日 1-3 錠，分 1-3 次飯後服用，不必咬碎，立即吞服即可。
2. 在實行大劑量療法時，原則上 1 日量服用 100 毫克以上。本藥須由醫師處方使用。
3. 如忘記用藥，想起來時應立刻補服，但如已很接近下次服藥時間，就不要補服，在下次服藥時間照平常的劑量服用。不可任意服用雙倍劑量

☞ 注意事項

1. 服用本藥後尿液呈黃色，此係本劑所含之維生素 B₂ 所引起，不必特別擔心。
2. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。