



藥物成分	劑型	櫃號
Tetracycline HCl	口服藥	
版本：TPE202309／流水號：2023-419		

☞ 藥品商品名及含量

"國嘉"特林膠囊 250 mg/粒

鹽酸四環素膠囊 250 mg/粒

☞ 藥品作用

革蘭氏陽性、陰性菌、立克氏體及巨型濾過性病毒感染症。

☞ 服用方式

1. 建議劑量為每 6 小時吃 1 次。空腹服用效果較佳(飯前一小時或飯後兩小時)，若胃不舒服可隨餐服用，但是避免與乳製品(牛奶、起司、優酪乳)併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 tetracycline, minocycline, doxycycline 或其他藥物有過敏的反應。若有皮膚疹症狀，請立刻就醫處理。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物 (包含非處方藥)，特別是制酸劑、抗凝血劑，如 warfarin、penicillin 和維他命。Tetracycline 可能會降低某些口服避孕藥的效果，此時您可能必須要用其他方式來避孕。
3. 注意制酸劑、鈣補充劑、鐵劑和含有鎂的緩瀉劑會降低 tetracycline 之藥效。服用 tetracycline 的時機必須在服用制酸劑、鈣補充劑和含有鎂的緩瀉劑的前一小時或兩小時後，而在服用鐵劑及含鐵的維他命產品時，則要在兩小時之前或三小時之後服用。
4. Tetracycline 會使您的皮膚對陽光敏感，所以應避免不必要

或長時間曝曬，而且要做好防曬工作，包括穿防護衣物、戴太陽眼鏡及擦防曬品。

5. Tetracycline 的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下無法忍受的副作用時，請盡快告知您的醫師：胃不舒服，腹瀉，肛門或陰道搔癢，嘴巴酸痛，皮膚或眼睛變黃。
6. 八歲以下兒童禁止服用本藥。
7. 若您已懷孕或計畫懷孕，或在服藥期間懷孕，就診時請務必告知醫師。