

## 藥物成分

## 劑型

## 櫃號

Sodium  
chloride

外用液

版本：TPE202309／檔號：2023-750

## ☞ 藥品商品名及含量

原子浣腸 20 毫升/個 (Atomic Enema)

久仁浣腸球液 20 毫升/個 (Chou Jen Enema)

## ☞ 藥品作用

利用生理食鹽水來刺激靠近肛門的肌肉達到排便效果。

## ☞ 使用方式

1. 成人及6歲以上：

將一劑注入直腸內，若未見效果時可再注入一劑，一天最多可使用二劑。

2. 3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之一半。

3. 未滿3歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

4. 使用時請先塗抹凡士林，並注意管口插入角度並小心緩慢推入，以避免刺傷肛門。使用後之剩餘液需丟棄，不宜留存。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，有胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人請勿使用。

2. 為防止兒童誤食請妥善保管且避免陽光直射。

3. 本藥不應長期使用，且使用時勿超過建議使用量；一旦排便正常，即應停藥，若使用超過一星期仍無效應考慮再次就醫。

4. 常見副作用為直腸刺激感、腹部不適。使用期間如有腹瀉不止、血便、自發性腸道出血或更嚴重情形，請立即停止使用，並回診接受醫師診治。

5. 目前對胎兒的風險不明，但目前資料顯示沒有顯著不良反應，孕婦、可能懷孕婦女若要使用請告知醫師。本藥幾乎不會分泌到母乳，有需哺乳請先諮詢醫師/藥師。