

藥物成分

劑型

櫃號

**Amlodipine /
Olmesartan medoxomil /
Hydrochlorothiazide**

口服藥

版本：TPE202310 / 檔號：2023-025

☞ 藥品商品名及含量

舒脈優膜衣錠 40/5/12.5 毫克/錠 (Sevikar HCT 40/5/12.5mg)

☞ 藥品作用

對血壓調節作用主要依其不同活性成分組成可分3種不同的作用機轉。Amlodipine是周邊動脈血管擴張劑，降低周邊血管阻力，進而降低血壓；olmesartan medoxomil阻斷血管收縮素II對於心肌、血管平滑肌、腎上腺與腎細胞的血管收縮及鈉滯留作用；而hydrochlorothiazide是一種thiazide類利尿劑，降低血管內的體液。

☞ 服用方式

1. 每日1次，每日1粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是磺胺類藥物過敏、無尿症、肝腎功能不全病人。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別 simvastatin、NSAIDs、鋰鹽、itraconazole、clarithromycin、cyclosporine。
3. 本藥可能會讓人暈眩/嗜睡/警覺性/協調能力降低，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。

5. 常見副作用為嘔吐、腹瀉、眩暈、皮膚搔癢，一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏反應、肌肉疼痛痙攣、意識不清/混亂。
7. 資料顯示本藥可能對胎兒有風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。