



藥物成分	劑型	櫃號
Metformin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-665		

☞ 藥品商品名及含量

漢伏醣錠 500 毫克/錠 (Henformin Tablets 500mg)

庫魯化錠 500 毫克/錠 (Glucophage Tablets)

庫魯化錠 850 毫克/錠 (Glucophage Tablet 850mg)

"優生"優糖平錠 850 毫克/錠 ("U-Liang" Eutomlin Tablets 850mg)

☞ 藥品作用

1. 本藥可增加胰島素的敏感性，達到控制血糖的效果，主要用於治療第二型糖尿病。
2. 本藥尚有其他臨床用途(如：多囊性卵巢症)，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~3 次，每次 1 粒，隨餐或飯後立即服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 metformin 引起過敏、糖尿病性酮酸中毒或昏迷病史、腎功能不全(eGFR 低於 30mL/min/1.73m²)、肝功能不全、酒精中毒或要進行大手術。
2. 酒精：請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物副作用(乳酸中毒)發生的風險。
3. 檢查：如有要進行含碘化物顯影劑的放射性診斷檢查(常見有尿道攝影、肝膽道攝影、血管攝影、斷層掃描等)，請事先告訴醫師或檢查醫事人員或藥師您正在服用此

藥，本藥須在檢查前後 48 小時停止使用。

4. **腎功能監測**：服藥期間，請定期監控腎功能(CIcr 或 eGFR)。
5. 常見副作用為腹瀉、嘔吐、脹氣、消化不良、噁心或味覺障礙等腸胃道不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)、**乳酸中毒**(呼吸急促、昏睡、酸痛、無力、全身不適、畏寒、眩暈等)
7. 單獨使用本藥極少出現低血糖，但若與其他有低血糖副作用的降血糖藥物併用時，須特別留意低血糖及監測血糖。
8. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。