



藥物成分	劑型	編號
Glycopyrronium/ Formoterol	噴霧 吸入劑	
版本：TPE202309 / 檔號：2023-230		




☞ 藥品學名及含量
必肺宜氣化噴霧劑 7.2 微克及 5 微克/每劑
(Bevespi Aerosphere)



☞ 藥品作用
慢性阻塞性肺病病人支氣管氣流阻塞的長期維持治療。

☞ 使用方式
通常每日 2 次，每次 2 下。

*** 新的必肺宜使用前請先對空噴 4 下以填裝完成**




 <p>1. 移除吸嘴外蓋</p>	 <p>2. 直立握住吸入器上下搖晃 5-10 下</p>	 <p>3. 先向旁盡量吐氣 (不可對吸嘴吐氣)</p>
 <p>4. 嘴巴含住吸口，按壓同時以緩慢而穩定的方式深吸氣 (頭可輕微後斜，舌頭不要堵住吸嘴)</p>	 <p>5. 移開吸入器，盡可能閉氣至 10 秒</p>	 <p>6. 慢慢吐氣</p>
<p>休息一下後重複步驟 2-6 完成第二個劑量</p>		

注意事項

1. 請依醫師指示用藥，不可自行調整劑量。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間用藥即可，不可為了補服而使用雙倍劑量。
2. 本品不適用於緩解急性支氣管痙攣或治療氣喘。
3. 如果**超過7天**未使用必肺宜，請先**對空按壓2次**再使用。
4. 常見副作用為咳嗽、泌尿道感染、關節痛/肌肉痙攣、口乾、嘔吐和頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化請回診。
5. 如果有下列症狀請立刻就醫：**嚴重心悸/心律不整、支氣管痙攣/慢性肺阻塞惡化、視力變化(模糊/疼痛)、無法排尿。**
6. 現有證據對孕婦使用時胎兒風險不明確，本藥可能會分泌到母乳裡，女性計畫懷孕/哺乳或已懷孕請諮詢醫師/藥師。

清潔方式

建議每週清潔吸入器一次，避免噴嘴塞住。

 <p>將壓力小瓶從本體取出 請勿讓壓力小瓶碰到水</p>	 <p>握住吸入器本體使水流過約30秒之後將本體轉向，使水從吸嘴處進入流30秒</p>
	<p>請自然風乾一夜後等完全乾燥再將壓力小瓶安裝回去本體。</p>

儲存方式

室溫乾燥陰涼處儲存，開封三個月若沒用完建議丟棄。

如何觀測剩餘藥量

1. 吸入劑壓力小瓶頂端附有一個劑量顯示器。在第一次使用吸入劑前，請確認顯示器指針為「120」。
2. 當吸入器只剩下20劑時，顯示器會轉換成紅色。

