



藥物成分

劑型

櫃號

Gliclazide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-612

☞ 藥品商品名及含量

速糖淨持續性藥效錠 60 毫克/錠 (Kludone MR)

岱蜜克龍持續性藥效錠 60 毫克/錠 (Diamicron MR)

☞ 藥品作用

本藥能增加胰島素分泌，也能讓人體能更有效的利用胰島素來降血糖，主要用來治療第二型(非胰島素依賴型)糖尿病。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 0.5 到 2 粒。
2. 建議早飯時服用(吃飯前 15~30 分服用或飯後馬上服用)，可剝半但不可磨碎或咀嚼。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師是否有藥物過敏或其他疾病，特別是酮酸中毒病史、高血糖高滲透壓非酮性昏迷、腎臟及肝臟功能異常或懷孕。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如類固醇、抗黴菌藥 Miconazole、水楊酸、胃藥 cimetidine、消炎止痛藥、fluoroquinolones、或其他降血糖藥須謹慎使用。
3. 可能會有**體重輕微上升**的情形，可藉由飲食及運動控制。
4. 請將本藥保存在幼童無法取得處，也不可給予別人使用。
5. 服藥初期因血糖濃度改變，可能產生短暫性視力障礙，

也可能有噁心嘔吐、腹瀉或腹痛等腸胃道不適，一般都不嚴重且會逐漸改善，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. **服用本藥可能發生低血糖，請索取低血糖衛教單張。**
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，但為避免新生兒發生低血糖症，服藥期間不建議哺乳。