



藥物成分

劑型

櫃號

Tetracycline

眼用藥

版本：TPE202309 / 流水號：2023-418

## ☞ 藥品商品名及含量

**鹽酸四環素眼藥膏 5 克/支 (Tetracycline Ophthalmic Ointment)**

**"人人"鹽酸四環素眼藥膏 5 克/支 (Tetracycline HCl Ophthalmic Ointment)**

## ☞ 藥品作用


眼部細菌傳染性炎症。

## ☞ 使用方式

1. 先將手洗淨擦乾。
2. 打開瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個空間。
4. 以另一手拇指及中指握住藥膏開口朝下，將眼藥膏擠出約 1 公分或依醫師指示的藥量，點在眼球及眼瞼形成的空間內。注意管口不要接觸到睫毛或眼睛，以防污染藥膏。
5. 眼睛輕閉約 2 分鐘，並轉動眼球使藥物均勻分布。
6. 用畢，蓋上瓶蓋，若有流至眼睛周圍之眼藥膏或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
7. 若同時需點眼藥水時，請先點眼藥水，間隔 10 分鐘後再依上述步驟點眼藥膏。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有會對 Tetracycline 過敏。
2. 若已塗於一般皮膚請勿再用於眼部，以避免交叉感染。
3. 眼部感染時不應配戴隱形眼鏡。
4. 點眼後可能會有短暫的視力模糊，請待視力恢復正常時再駕車或操作機械。
5. 依照醫師指示使用，勿自行停藥或使用超過醫師指示的時間長度。

- 
6. Tetracycline 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法忍受，請盡快告知您的醫師：眼睛痛、眼睛搔癢、眼睛刺激、眼睛充血、視力模糊、過敏反應等。
  7. 孕婦用藥等級：D。若您已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。若您計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。
  8. 目前未知 Tetracycline 眼藥膏是否分泌於人類乳汁，若有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。