



藥物成分	劑型	櫃號
Hydroxyurea	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-622		

☞ 藥品商品名及含量

愛治膠囊 500 公絲/膠囊 (Hydrea)

☞ 藥品作用

可減緩或停止體內癌細胞的生長，可用來治療黑色素瘤、慢性髓性白血病、卵巢癌、頭/頸鱗狀細胞癌。

☞ 服用方式

1. 間歇療法採 3 天服用 1 次的方式使用，持續療法則每天 1 次使用，醫師會依照病人體重和腎功能調整劑量。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是骨髓、腎臟或貧血方面疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他骨髓抑制劑、接受放射線治療、降尿酸用藥、warfarin、抗病毒藥物 didanosine、stavudine。
3. 如欲接種活性疫苗，請先詢問醫師或藥師。
4. 在接觸瓶子或膠囊前後，均應清洗雙手。
5. 本藥有骨髓抑制之副作用，可能會使白血球較低，請出入公共場合時戴口罩、勿生食(水果去皮)、不要接觸感冒的人/土壤/汙物/排泄物、小心避免受傷，隨時注意自己有沒有感冒/喉痛、虛弱/發燒或小便灼熱疼痛等症狀。
6. 使用本藥可能會噁心嘔吐或食慾不振，建議可以少量多餐的方式並且多漱口以加強口腔衛生。
7. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、食慾不振、骨髓抑制、口腔炎等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍

受請回診。

8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：紅疹/皮疹/搔癢、呼吸或吞嚥困難、嚴重腹瀉、視覺遲鈍。
9. 目前資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，治療期間應有避孕措施。
10. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。
11. 此藥品可能會影響環境，過期或剩餘應交由醫院或社區藥局處理。