



| 藥物成分                               | 劑型         | 櫃號 |
|------------------------------------|------------|----|
| <b>Amlodipine/<br/>Telmisartan</b> | <b>口服藥</b> |    |
| 版本：TPE202310／檔號：2023-26            |            |    |

## ☞ 藥品商品名及含量

倍必康平錠 5 及 80 毫克/錠 (Twynsta Tablet)

倍壓妥錠 5 及 80 毫克/錠 (Co-Midis Tablet)

## ☞ 藥品作用

本藥可透過降低周邊血管阻力方式穩定血壓。

## ☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒。可與食物一起服用，亦可空腹服用。
2. 本藥具吸濕性，建議服用前再從包裝中取出藥錠。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是懷孕、心血管疾病、肝腎功能不全。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其它降血壓藥物(尤其是 ACEIs、ARBs 或 aliskiren)、digoxin、鋰(Lithium)、非類固醇抗發炎藥物(NSAID，包括選擇性 COX-2 抑制劑)、免疫抑制劑(cyclosporin 或 tacrolimus)。
3. 糖尿病患者或腎功能不全(GFR < 60 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)患者請勿同時併用直接腎素抑制劑(aliskiren)及倍必康平(Twynsta)。
4. 本藥可能會讓人暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為消化不良、週邊水腫、頭暈、頭痛、背痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心悸、胸痛、呼吸困難、異常出汗、排尿困難、嚴重過敏反應。
7. 資料顯示懷孕期間使用本藥，可能對發育中的胎兒造成傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。