



藥物成分

劑型

櫃號

Acetylcysteine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-511

## ☞ 藥品商品名及含量

愛克痰發泡顆粒 600 毫克 (Actein Effervescent Granules)

富泌舒痰發泡顆粒 600 毫克 (Fluimucil A Effervescent Granules)

## ☞ 藥品作用

減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1-2 次，每次 1 包，最好晚上服用。
2. 將 1 包發泡顆粒置於玻璃容器中，加入 150 cc 以上的水溶解，混合均勻後服用(混合後，請於 2 小時內服用完畢)。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 若有懷孕或正在哺乳、肝腎疾病、食道出血、胃潰瘍、心衰竭、氣喘等疾病或有任何藥物過敏請告知醫師。
2. 若有進行低鈉飲食或酒癮病史難以咳嗽的情形，亦請告知醫師。
3. 本品含有甜味劑阿斯巴甜(Aspartame)，故苯酮尿症患者、孕婦及幼兒不宜使用。
4. 若為患有支氣管哮喘的病人用藥需特別注意，當出現支氣管痙攣時治療必須立刻停止。
5. 常見副作用為嘔吐、噁心、腹瀉、紅疹及食慾不振。可能有不宜人的氣味。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重過敏症狀(皮膚搔癢、雙眼、嘴唇、舌頭或面部腫脹、呼吸困難、喉嚨發緊或吞嚥困難)、胸悶、嚴重或持續性嘔吐、紅疹不論有無發燒或咳血紅疹伴隨發燒。