

藥物成分

劑型

櫃號

Fluorometholone

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-598

## ☞ 藥品商品名及含量

好視多眼用懸浮液 0.2 毫克/毫升 0.02% 10 毫升 (Foxone Ophthalmic Suspension)

復爾朗點眼懸液 0.2 毫克/毫升 0.02% 10 毫升 (Fluorone Ophthalmic Suspension)

## ☞ 藥品作用

眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎。

## ☞ 使用方式

1. 使用前請徹底振搖，滴入 1~2 滴在眼結膜囊中，每日 2~4 次。
2. 使用兩種眼藥水時，請間隔至少 5 分鐘。
3. 使用兩種眼藥時，先使用藥水再用藥膏，並間隔至少 10 分鐘。
4. 請依照醫師指示用藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 使用時壓住淚管，可將藥物被身體吸收的可能性降低。
3. 敏感患者長期使用可能造成眼內壓升高，需定期檢查眼內壓。
4. 許多眼疾及長期使用皮質類固醇者會導致角膜和鞏膜變薄，或惡化其他眼部感染，若有相關症狀請立即就醫。
5. 不可接觸眼藥水滴出口，以免汙染本藥品。使用完畢或不用時，應鎖緊瓶蓋，以防止汙染。開瓶四週內使用完畢，逾期未使用完畢者請丟棄不用。

臺北市立

**6. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕、已懷孕、哺乳不建議使用本藥。**