



藥物成分	劑型	櫃號
Solifenacin	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-754		

☞ 藥品商品名及含量

勝康膜衣錠 5 毫克/錠 (Vebacin F.C.)

衛喜康膜衣錠 5 毫克/錠 (Vesicare F.C.)

☞ 藥品作用

是一種蕈毒鹼受體(Muscarinic receptor)拮抗劑，可減少膀胱平滑肌的收縮，用於治療膀胱過動症病人所伴隨之急迫性尿失禁、頻尿、尿急等症狀。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1~2 粒，可隨/不隨食物一起整粒吞服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經因 solifenacin 引起過敏、尿滯留、胃滯留、狹角性青光眼、重症肌無力、中/重度肝腎功能不良患者應調整劑量。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗黴菌藥物如 Ketoconazole、胃腸促動劑、心律不整藥物。
3. 本藥可能會讓人發生視力模糊或疲倦，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。兒童的安全性、有效性未確立，故不可使用本品。
4. 常見副作用：口乾、便秘、視力模糊、尿液滯留等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請停用藥物並立刻就醫：眼周、嘴唇、舌頭、喉嚨腫脹、呼吸困難

臺北市立

6. 懷孕：目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
哺乳：本藥分泌到母乳的量不明，服藥期間不建議哺乳。