



藥物成分

劑型

櫃號

Venlafaxine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-446

☞ 藥品商品名及含量

悅康持續性膠囊 75 毫克 (Easyfor SR)

暉致速悅持續性藥效膠囊 75 毫克(Effexor XR)

☞ 藥品作用

用於治療鬱症、泛焦慮症、社交焦慮症、恐慌症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 每日早上或晚上同一時間隨餐服用，以開水吞服整粒膠囊，不得撥半、咬碎、咀嚼或放入水中。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是高血壓、出血疾病、青光眼、躁症、精神疾病、癲癇、低血鈉症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是單胺氧化酶抑制劑(MAOI)、血清素致效藥物(例如：triptans、SSRIs、SNRIs、linezolid 等)、干擾凝血的藥物(例如：NSAIDs、Aspirin 和 Warfarin)。
3. 留意是否出現嚴重焦慮、恐慌發作、失眠、易怒、衝動、自殺意念或行為，尤其在治療初期或劑量調整時。突發或惡化時，請告知醫師或醫療人員。
4. 常見副作用為：噁心、嗜睡、口乾、厭食、便秘，若症狀惡化且無法忍受請回診。建議定期監測血壓、血脂。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：幻覺、暈厥、抽搐、昏迷。

臺北市立

6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。