

藥物成分

劑型

櫃號

Erlotinib

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-581

☞ 藥品商品名及含量

得舒緩膜衣錠 150 毫克/錠 (Tarceva F.C.)

☞ 藥品作用

作用於表皮生長因子受器(EGFR)的抗癌標靶藥物，可以減緩體內癌細胞的生長，可用於治療非小細胞肺癌或肺腺癌。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，建議空腹服藥。
2. 應於進食前至少 1 小時，或進食後 2 小時服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎疾病、胃腸潰瘍出血。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗凝血藥 warfarin、CYP3A4 抑制劑：抗病毒藥(蛋白酶抑制劑)、azole 類抗黴菌劑、巨環類抗生素(clarithromycin)；強效 CYP3A4 誘導劑：抗癲癇藥、抗結核病藥、聖約翰草；ciprofloxacin。
3. 服藥期間請避免抽菸及吃葡萄柚(汁)，可能會影響藥物代謝。
4. 常見副作用為皮疹、腹瀉、厭食、疲倦、頭暈、眼睛會較為乾燥，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、肺部發炎(咳嗽、發燒)、水泡性(bullous)、發泡性(blister)或脫皮性皮膚疾病、有急性或惡性眼睛疾病(如角膜穿孔或潰瘍等)。

臺北市立

6. 懷孕等級 D，服藥期間及治療完成後的至少 2 週內應避免懷孕，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。