

藥物成分

劑型

櫃號

Piroxicam

外用藥膏

版本：TPE202309／檔號：2023-703

☞ 藥品商品名及含量

痛立平乳膏 10 毫克/公克 (Tonex Cream)

完疲痠痛凝膠 10 毫克/公克 (Toricam Cream)

☞ 藥品作用

緩解發炎反應引起的症狀，具解熱、鎮痛作用。

☞ 使用方式

1. 每日數次，取適量塗抹於患處並輕輕按摩擦入。
2. 請依照醫師或藥師指示使用，不可自行增加使用次數。若不慎忘記使用，請立即使用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間塗藥即可，不可為了補用而使用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對非類固醇消炎藥過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服止痛藥。
3. 使用前、後請清洗雙手。
4. 本藥只可使用於完整之皮膚表面，不可使用於創傷、刀傷等之暴露性傷口表面。
5. 本藥不可用於皮膚感染症及化膿性皮膚炎的治療。
6. 常見副作用為偶有搔癢、灼熱感、局部發炎、過敏性皮膚炎等現象。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師；本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。