



藥物成分

劑型

櫃號

Esomeprazole

口服藥

版本：TPE202309／櫃號：2023-191

☞ 藥品商品名及含量

耐適恩錠 40 毫克/錠 (Nexium)

易舒康活腸膜衣錠 40 毫克/錠 (Esocomfort)

☞ 藥品作用

1. 抑制胃酸分泌，用於潰瘍、胃食道逆流性疾病、胃酸分泌過多(如：Zollinger-Ellison Syndrome)之治療。
2. 降低長期使用非固醇類抗發炎藥(NSAIDs)而發生的潰瘍。
3. 與其他抗菌劑併用來治療幽門螺旋桿菌引起反覆性的胃部潰瘍。

☞ 服用方式

1. 通常一日 1 次，每次 1 粒，餐前一個小時服用。
2. 需整粒吞服，不可磨粉或壓碎，如使用鼻胃管請加水溶解後使用。
3. 請遵照醫囑服用，且勿自行改變藥量及頻次。請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病、骨鬆症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗血小板製劑、抗凝血劑、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥、抗黴菌藥、抗生素、抗病毒劑、免疫調節劑、鐵劑。
3. 常見副作用為頭痛、腹瀉或便秘、噁心、排氣、胃痛、口乾，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚起水泡或脫皮；蕁麻疹；皮疹；呼吸或吞嚥困難；手、臉、嘴唇、舌頭、喉部、

眼睛、關節或腳腫脹；聲音嘶啞。

5. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
6. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。