



藥物成分

劑型

櫃號

Indapamide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-239

## ☞ 藥品商品名及含量

壓樂克膜衣錠 2.5 毫克/錠 (Iloka F.C.)

壓利得膜衣錠 2.5 毫克/錠 (Nakamide F.C.)

## ☞ 藥品作用

可用來減緩心臟疾病所引起的腫脹和體液滯留，此外也可用來治療高血壓

## ☞ 服用方式

1. 每日 1-2 次，每次 1 粒，或需要時服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數；當覺得情況有改善時必須持續服用藥物，不能自行停藥。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎疾病、心臟疾病、心律問題、糖尿病、痛風、排尿困難或是曾對磺胺類藥物產生過敏者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 digoxin、鋰鹽、類固醇。
3. 服用利尿劑應注意是否有電解質不平衡、低血壓或是肌肉無力等症狀。
4. 常見副作用為：便秘、腹瀉、食慾變差、胃痛。但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(如搔癢、臉部或手部腫脹、異常出血)。
6. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。