



藥物成分	劑型	櫃號
Carteolol HCl	眼用藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-098		

☞ 藥品商品名及含量

大塚美特朗持續性點眼液 2% 2.5ml (Mikelan LA Ophthalmic Solution)

欣克朗點眼液 2% 5ml (Karteol Ophthalmic Solution)

☞ 藥品作用

減少眼睛分泌眼房液，進而治療青光眼或降低眼內壓。

☞ 使用方式

1. 每眼每次 1 滴，每日 1 次。
2. 點藥前需取出隱型眼鏡，點藥後至少要隔 30 分鐘再戴上
3. 請依醫師指示滴藥，不可自行調整劑量或增加滴藥次數。
若不慎忘記滴藥，請立即補滴，但若已接近下一次滴藥，在下次用藥時間滴藥即可，不可為了補劑量而滴用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心血管疾病、肺部疾病、糖尿病、甲狀腺疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 β 阻斷劑、交感神經抑制劑、鈣離子阻斷劑、Adrenaline 等。
3. 當同時投與其他點眼液時，請使用其他點眼液後至少間隔 10 分鐘，再使用本點眼液。
4. 點眼後可能會有短暫的視力模糊，開車或做其他需要有清楚視力的工作時，請小心使用。
5. 常見副作用為視覺模糊、燒灼感、結膜充血、結膜水腫、眼分泌物、搔癢、乾眼、頭暈及頭痛、睡眠障礙、乏力，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重的眼睛刺激或發炎、胸痛、嚴重眩暈或暈厥、腳腫脹、心跳變慢或不規則、呼吸困難、不尋常的肌肉無力。

臺北市立

聯合醫院

TAIPEI CITY

HOSPITAL

TAINAN CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

YUNLIN CITY HOSPITAL

KEELUNG CITY HOSPITAL

TAIPEI CITY HOSPITAL

7. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。