



藥物成分

劑型

櫃號

Clonidine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-126

☞ 藥品商品名及含量

降保適錠 75 微公克 (Catapres tablet)

☞ 藥品作用

本藥藉由降低中樞神經系統的交感神經作用，進而降低末梢血管阻力達到降血壓及減慢心跳的效果。

☞ 服用方式

1. 通常一日 2 次，每次 1~2 粒。
2. 突然中斷治療可能導致緊張、焦躁不安、頭痛、震顫，伴隨著血壓急速上升。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是病態竇房症候群(sick-sinus syndrome)、第 2 或 3 級房室傳導阻斷、遺傳性半乳糖不耐症、嗜鉻性細胞瘤、肝腎疾病、腦血管疾病或近期有發生心肌梗塞。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他降壓劑、三環抗憂鬱劑、影響心臟傳導功能之藥物 (如毛地黃、鈣離子通道阻斷劑、乙型阻斷劑)、中樞神經系統抑制劑 (如鎮靜劑、精神安定劑) 或非類固醇類抗發炎藥。
3. 請勿飲用酒類，因酒精會增強此類藥物的鎮靜作用。
4. 本藥可能會讓人嗜睡，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為口乾、疲倦、嗜睡、頭暈以及便秘，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

臺北市立

6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：全身性交感神經活性降低之症狀，如瞳孔縮小、嗜眠、心律減慢、低血壓、體溫過低、呼吸不順暢。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。