



藥物成分

劑型

櫃號

Benzonatate

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-052

☞ 藥品商品名及含量

咳治得軟膠囊 100 毫克/膠囊 (Zcough)

☞ 藥品作用

緩解因感冒或支氣管炎引起之咳嗽症狀。

☞ 服用方式

1. 一日 3 次，每次 1~2 粒。
2. 整顆吞服，不可咀嚼或咬碎，以免產生局部麻醉效果，可能會有噎到的風險。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏，特別是曾經對本成份過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 常見副作用為噁心、腸胃不適、便秘、頭痛、暈眩、搔癢、皮疹、鼻塞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果服用後若發生舌頭、口部、喉嚨或臉部麻痺感，請暫時不要飲食，待麻痺感消退後再飲食。
5. 如果有出現痙攣症狀，請立刻就醫。
6. 14 歲以下兒童及吞嚥困難者不得使用。
7. 目前對胎兒的風險不明，但臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。