



藥物成分

劑型

櫃號

Pipemidic acid

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-344

## ☞ 藥品商品名及含量

圖留康膜衣錠 250 毫克/錠(Dolcol Film Coating Tablets)。

## ☞ 藥品作用

本藥是治療細菌感染所引起的腎盂腎炎、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎、中耳炎、赤痢、腸炎、副鼻腔炎。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 3-4 次，每次 2-8 錠。
2. 服藥前後 2 小時內請勿服用制酸劑或其他含鈣、鎂、鋁、鐵、鋅的產品，以避免降低藥物的療效。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數或突然停藥。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是癲癇、肝腎疾病或曾經接受器官移植。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是皮質類固醇、氣管擴張劑 theophylline、降血糖藥或胰島素。
3. 本藥可能會讓人暈眩或注意力無法集中，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
4. 可能會增加曬太陽產生的過敏，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
5. 常見藥物副作用為輕微腹瀉、頭痛、噁心的情形發生，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診告知醫師。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹或口腔破皮脹痛)，嚴重且持續腹瀉、血便、肌腱關節疼痛腫脹或麻痺感、精神或行為改變、失眠、意識混亂、幻覺、記憶受損等。

臺北市立

7. 目前對胎兒的風險不明，女性可能懷孕或懷孕請勿使用，計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

8. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。