



藥物成分	劑型	櫃號
Clobetasol Propionate	外用藥膏	
版本：TPE202309／檔號：2023-124		

☞ 藥品商品名及含量

倍絡宜乳膏 0.5 毫克/公克 (Belolin Cream)

倍絡宜軟膏 0.5 毫克/公克 (Belolin Oint.)

各宜乳膏 0.5 毫克/公克 (Euclobe Cream)

滿汝意軟膏 0.5 毫克/公克 (Multigive Oint.)

☞ 藥品作用

作為含類固醇外用藥品，具有抗發炎、止癢及血管收縮作用，可用於牛皮癬、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡以及濕疹。

☞ 使用方式

1. 一天 1~2 次，取適量塗抹於患處；情況若獲改善後應停止用藥，不建議連續使用超過 2 周。
2. 應避免使用於眼睛及其四周圍。
3. 對於較具抵抗力之患部(如肘部、膝部之牛皮癬厚斑)，可以 PE 膜覆蓋在塗敷藥物後的患部藉以增強作用。請事先詢問醫師。
4. 治療時間不建議超過四週，如必須繼續接受治療時，應改用藥效較溫和的類固醇製劑。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是未治療的皮膚感染、酒渣鼻、尋常性痤瘡、口圍皮膚炎、肛門及生殖器瘙癢症、原發性皮膚濾過性病毒感染(如單純疱疹或水痘)。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在使用其他藥物，特別是其他類固醇藥物、蛋白酶抑制劑、含 paritaprevir/ritonavir 組合之抗 C 型肝炎藥物或強效 CYP3A4 抑制劑。
3. 本藥品不適用於治療由黴菌或細菌引起的原發性皮膚感染症，若發生任何感染應停止使用。

4. 常見副作用為局部萎縮性變化（如皮膚變薄、產生皺紋）、微血管擴張、搔癢、灼熱或刺痛感、皮膚乾燥，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 不適用於一歲以下幼兒的皮膚病，包括皮膚炎及尿布疹。使用本藥品於孩童時，建議每週回診一次做評估。
6. 長期大量的使用於臉部或廣泛部位，可能會因足夠全身性吸收，而產生腎上腺皮質機能亢進症（庫欣氏症候群）；其表現為水腫、體重增加、滿月臉、水牛肩、疲倦無力、高血壓等。
7. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，孕婦除非必要應避免使用，若有懷孕計畫或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，若需於哺乳期間使用，不可塗抹於乳房，以免嬰兒誤食。