



藥物成分

劑型

櫃號

Aprepitant

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-525

☞ 藥品商品名及含量

止敏吐膠囊 125 毫克/膠囊 (Emend)

☞ 藥品作用

本藥與其他止吐藥一起服用，可以防止在使用容易引起嘔吐的癌症化療藥物後所引起的急性或延遲性噁心與嘔吐。

☞ 服用方式

1. 本藥依病症而有不同的使用療程，請按醫師指示為主。
2. 化療止吐通常為三日療程，第 1 粒會在化療進行前 1 小時使用，或是手術前 3 小時使用，之後每日 1 粒。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已距離下一次服藥時間 12 小時以內，請在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，如：ketoconazole、itraconazole、clarithromycin、ritonavir、rifampin、phenytoin、paroxetine、tolbutamide、diltiazem carbamazepine、口服避孕藥與抗凝血劑 warfarin。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 使用抗凝血劑 warfarin 的病人，服藥期間，應定期監控凝血功能(PT/INR)。
5. 常見副作用為便秘、腹瀉、虛弱、腹痛、食慾降低、打嗝、頭痛、頭暈、肝功能指數升高，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診，或在回診時告知醫師。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難、發燒、吞嚥困難、血/黑便、類流感症狀或昏厥。
7. 女性計畫懷孕或已懷孕以及哺乳請事先告知或諮詢您的醫師/藥師。