



| 藥物成分 | 劑型 | 櫃號 |
|--|------------|----|
| Tripotassium dicitrate bismuthate | 口服藥 | |
| 版本：TPE202309／檔號：2023-439 | | |

☞ 藥品商品名及含量

克潰泌膜衣錠 120 毫克/錠 (KCB)

☞ 藥品作用

本藥為鉍鹽，用來治療及防止復發胃潰瘍及十二指腸潰瘍。

☞ 服用方式

1. 每日 2 次每次 2 粒，或者每日 4 次每次 1 粒，連續服用 4~8 星期。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腎功能不全病患。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是四環黴素。
3. 可能的藥物副作用：噁心、嘔吐、灰色糞便，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 胎兒的風險未被證實有傷害，女性計畫懷孕或已懷孕請務必告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，但考量嬰兒風險建議勿哺乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。