



藥物成分

劑型

櫃號

Methadone

口服液

版本：TPE202309／櫃號：2023-472

☞ 藥品商品名及含量

口服液：美沙冬 Methadose 為 Methadone 10mg/ml

☞ 藥品作用

類鴉片物質成癮之戒毒、類鴉片類物質成癮替代療法。

☞ 服用方式

1. 每天口服 1 次，劑量是醫師依據個案成癮情況開立。
2. 美沙冬濃縮內服液僅供口服使用，不得注射使用。

☞ 注意事項

1. 初期服用藥物需從低劑量開始，經由醫師評估後，再慢慢調高劑量，初期仍需稍微忍受戒斷症狀，且尚未調整穩定，可能會出現嗜睡、頭暈不適，類似感冒的症狀，於治療初期宜避免開車或操作器械，以免發生危險。
2. 美沙冬可能會造成呼吸抑制作用，患有急性氣喘或血中二氧化碳濃度過高者為使用禁忌。
3. 因美沙冬在體內有累積作用，在療程中應避免同時使用藥物、酒精或其他非法物質，以避免發生藥物中毒，造成生命危險。如需服用任何其他藥物，請告知您的醫師，您正在服用美沙冬。
4. 美沙冬副作用有便秘、噁心、嘔吐、無力、頭昏眼花、困倦，大部分的副作用會在數週內消失，但便秘及多汗可能會持續存在。
5. 美沙冬產生戒斷症狀的時間較慢，通常會在最後一次用藥後 24~48 小時出現。此時可能會有腹痛、噁心、嘔吐、不安、緊張、食慾減退、抑鬱、流淚、流鼻涕、骨頭痠痛等情形。

☞ 其他注意事項

若為孕婦或授乳婦時，應於進行替代療法前告知醫師。