



藥物成分

劑型

櫃號

Famciclovir

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-205

## ☞ 藥品商品名及含量

抗濾兒膜衣錠 250mg/錠 (Famvir F.C.)

## ☞ 藥品作用

用於帶狀疱疹及生殖器疱疹急性感染、抑制反覆性生殖器疱疹復發。

## ☞ 服用方式

1. 治療「帶狀疱疹」通常每 8 小時服用 1 次(一天服用 3 次)連續服用 7 天；治療「生殖器疱疹」每 8-12 小時服用 1 次(一天服用 2-3 次)，連續服用 5 天。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對 famciclovir、famciclovir、acyclovir、乳糖或其他藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是有其他疾病，特別是肝臟或腎臟疾病、人類免疫缺陷腺病毒感感染(HIV)、後天免疫不全症候群 (AIDS)。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 probenecid、raloxifene。
4. 本藥可與食物或不與食物併服。
5. 常見副作用為腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛、疲勞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 服用本藥後有些人會感覺頭暈、想睡、精神混亂或其他中樞神經系統障礙的症狀，應避免開車或操作機器。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(血管性水腫(例如：臉部水腫、眼瞼水腫、呼吸困難)、蕁麻疹、嚴重皮

膚搔癢)；肝功能異常(食慾降低、疲倦、胃腸不適、茶色尿、皮膚或眼白變黃)

8. 生殖器疱疹是一種性接觸傳染疾病，甚至在沒有症狀時也會傳染，本藥物無法預防疾病傳染。在使用藥物治療期間，應盡量避免性行為或採用「安全性行為」的作法。
9. 本藥用於懷孕期間的資料不足，因此不應於懷孕期間使用。若您已懷孕或計畫懷孕，就診時請務必告知醫師。
10. 本藥不應用於餵哺母乳的母親。若您正在哺乳，就診時請務必告知醫師。