

藥物成分

劑型

櫃號

Pimozide

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-699

☞ 藥品商品名及含量

杜鬱錠 2 毫克/錠 (Topimo)

☞ 藥品作用

本品作用為精神鎮靜劑，可用來治療慢性思覺失調症。

☞ 服用方式

1. 通常每日早上 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心電圖異常、癲癇、帕金森氏症、肝、腎功能不良病史。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Macrolide 類抗生素(如: clarithromycin, erythromycin)、Azole 類抗黴菌藥(如: ketoconazole, fluconazole, itraconazole)、抗病毒藥(如: ritonavir)、fluoxetine、sertraline、其他精神疾病相關藥物。
3. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 常見的副作用為口乾、頭暈、低血壓、姿勢性低血壓、便秘、錐體外症候群(肌張力異常、靜坐不能、肌肉僵硬、顫抖等)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 服用此藥期間請勿開車、操作機械或飲酒。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。