



藥物成分	劑型	櫃號
Ibuprofen	口服液	
版本：TPE202309／櫃號：2023-623		

☞ 藥品商品名及含量

依普芬口服懸液劑 20 毫克/毫升 (Ibuprofen Susp.)

馬蓋先口服懸液 20 毫克/毫升 (Mac Safe Susp.)

☞ 藥品作用

消炎、鎮痛、解熱。

☞ 服用方式

1. 6 個月~12 歲孩童:通常每日 3-4 次(需間隔 6-8 小時)，兒童使用量會依照體重計算。
2. 成人：每日 4 次，每次 10~20 毫升。
3. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
4. 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。
5. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化性潰瘍、胃腸出血、阿斯匹靈(aspirin)或非類固醇消炎止痛藥引發之氣喘/鼻炎/蕁麻疹或其他過敏反應、心血管或肝腎疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是非類固醇消炎止痛藥藥物、抗凝血藥物、抗血小板藥物、血管收縮素轉化酶抑制劑或血管收縮素受體阻斷劑等抗血壓藥物、銀杏萃取物。
3. 使用於持續嘔吐、腹瀉及脫水孩童，應監測腎功能。
4. 進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內禁用本藥。
5. 本藥可能會讓人嗜睡及暈眩，在還沒確定對您有何影響前，

請勿開車或操作危險機械。

6. 常見副作用為腸胃不適、噁心嘔吐、便秘、水腫、皮膚發紅、搔癢，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：史蒂文生強生症候群（皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等）、消化道出血（腹痛、解鮮紅色或黑便、吐血或咖啡色渣、虛弱、呼吸困難等）、心臟疾病急性發作或中風（胸痛、呼吸短促、身體半邊無力、口齒不清、腿腫）。
8. 目前對胎兒的風險不明，但資料顯示動物實驗中有致畸胎的紀錄，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
9. 可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。