

藥物成分

劑型

櫃號

Benzyl
Benzoate

外用液

版本：TPE202309／檔號：2023-501

- ☞ 藥品商品名及含量 (俗名：B.B. Lotion)
 疥寧洗液 250 毫克/毫升 150 毫升/瓶 (Jaline Lotion)
 剋疥寧洗劑 25% Benzyl Benzoate (B.B. Lotion)

- ☞ 藥品作用
 為一種酯類化合物，能有效殺死寄生性節肢動物，可用於治療疥癬、蝨感染。

- ☞ 使用方式 (本藥品為外用洗劑，請勿內服)
 請按照醫師之指示確實完成療程頻率及天數，通常方法如下：

1. **疥癬**：將身體以肥皂熱水洗淨擦乾後，使用前先振搖藥液，將藥液薄塗於頸部以下之全身(趾縫及耳後都要塗抹)，需 24 小時後，再以肥皂及溫水徹底洗淨，一般療程約 3 天。
2. **蝨感染**：先將頭髮洗淨吹乾後，使用前先振搖藥液，再將適量藥液倒在擦乾的頭髮和頭皮上充分搓揉。需等 24 小時後再以洗髮精或肥皂及溫水清洗乾淨。開始療程後每 8-12 小時可用密梳刷除毛髮上殘餘之蝨卵或蝨屑。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否對此藥品曾有出現皮疹、蕁麻疹等藥物過敏反應。
2. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
3. 在治療開始後，患者及接觸者所使用之衣物、床巾等需以熱水(55~60°C)燙洗或高溫烘乾至少 30 分鐘；不能洗的衣物和棉被，可以乾洗或密封於塑膠袋內至少兩週。
4. 本藥品對皮膚可能會有刺激性，使用時應避免接觸臉部、眼睛、黏膜、開放性傷口等部位。
5. 建議完成療程兩周後，請回診評估治療效果。
6. 常見副作用為短暫的發紅、刺痛、灼熱、乾燥、皮疹等

皮膚刺激，若症狀惡化且無法忍受請回診與醫師討論是否要更換藥品或是更改療程。

7. 目前本藥品對孕婦及胎兒的安全性及風險尚未確立，但目前資料顯示於動物實驗中尚未有發現不良反應，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。