

藥物成分

劑型

櫃號

Pancreatin

Metoclopramide HCl

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-695

☞ 藥品商品名及含量

立消樂錠 212.5 毫克+ 5 毫克/錠 (Dimotil Repe)

暢腹立膜衣錠 212.5 毫克+ 5 毫克/錠 (Panzyme)

Pancreatin 為複方消化酵素：212.5 毫克=amylase 6500 U+ lipase 8000U+ protease 450U

☞ 藥品作用

消化器機能異常(噁心、嘔吐及腹部膨滿感)。

☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1-2 粒，餐時服用。
2. 本藥須由醫師處方使用，請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是精神科藥物或緩解痙攣藥物(可能減低藥效)。
3. 常見副作用為困倦、頭痛等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如有下列症狀，請立刻就醫：錐體外徑症候群(頭歪眼斜吐舌、肢體靜止時顫抖、有持續不自主動作或無法靜坐)
5. 在較高劑量下偶而有輕微的嗜睡及煩躁不安、溢乳現象。
6. 酒精會加重此藥嗜睡作用，服用此藥期間請勿飲酒。
7. 本藥不建議長期使用超過 12 週，除經過評估其治療效益高於發生遲發性運動障礙之風險者。
8. 臨床資料不足，目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥可能會對中樞神經系統有影響，



有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

