



藥物成分	劑型	櫃號
Levodopa / Benserazide	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-269		

☞ 藥品商品名及含量

美道普持續性藥效膠囊 100/25 (Madopar HBS cap)

美道普錠 200/50 毫克 (Madopar tablet)

☞ 藥品作用

治療帕金森氏病及相關症狀，包含顫抖、肌肉僵硬、動作遲緩。

☞ 服用方式

1. 此藥應在飯前至少 30 分鐘或飯後 1 小時服用。
2. 美道普持續性藥效膠囊應整顆吞服；美道普錠可分成小片以利吞服。
3. 此藥劑量因個人症狀而有不同，通常最初每次為 1/4 錠，每天 3~4 次服用，再根據病人反應慢慢增加劑量。
4. 每日劑量相當於 300~800 毫克的 levodopa 和 75~200 毫克的 benserazide，分成 3 次或更多次服用。
5. 未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數，也不可以突然停藥而未告知您的醫師，突然停藥可能會造成病情復發。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是氣喘、肺氣腫或其他肺部方面的疾病、腎臟病、肝臟疾病、青光眼、心臟病、皮膚癌、癲癇症、糖尿病、胃潰瘍等等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 MAO 抑制劑(即使您停用這些藥物已經兩個禮拜)，如：phenelzine (Nardil)、tranylcypromine (Pavabid)，制酸劑，benztropine (Cogentin)，dicyclomine (Bentyl)，抗憂鬱和抗焦慮的藥物，papaverine (Pavabid)，phenytoin

(Dilantin) ，鎮定劑，trihexyphenidyl (Artane) ，含有 pyridoxine(維他命 B6)的食物或其他一些維他命。

3. 常見副作用為失眠、胃口降低、注意力不集中、流汗增加、疲倦、做惡夢、噁心嘔吐、緊張、頭痛、頭暈目眩、虛弱等等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 請定期回診。如果在一段長時間的服藥後，頭部、臉部、舌頭或頸部產生重複而且不能自行控制的運動，或者帕金森氏病的症狀惡化，就應當盡快地通知您的醫師。
5. 如果您患有糖尿病，請告訴您的醫師，此藥可能會干擾尿液血糖測試的結果，因此在服用此藥之前，應該請教醫師如何正確地測量血糖，和如何適當地調整糖尿病藥物的劑量或飲食。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：手部顫抖、心跳加快增強、走路困難、背部頸部肌肉僵硬痙攣、臉部或手腳不能自行控制的運動等等。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
8. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
9. 此藥會使尿液的顏色變暗，這是正常的現象，不需要因此而停止或中斷服藥。不要讓任何人服用你的藥物。