



藥物成分

劑型

櫃號

Proparacaine

眼用藥

版本：TPE202309／檔號：2023-363

☞ 藥品商品名及含量

愛爾卡因點眼液 0.5%，15 毫升/瓶 (Alcaine 0.5%, 15mL)

☞ 藥品作用

眼科用表面麻醉劑。

☞ 使用方式

1. 一般每次使用 1-2 滴，請依照醫師指示用藥，不可自行調整用量或增加用藥次數。若不慎忘記用藥，請立即補用，但若已接近下一次用藥時間，在下次用藥時間使用即可，不可為了補用而服用雙倍用量。
2. 容器尖端應避免接觸眼睛、眼瞼、手指頭等部位。
3. 開封四週後，未用完之殘藥請丟棄。
4. 使用兩種以上眼藥時，先使用藥水再用藥膏，並間隔至少 5 分鐘。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心臟疾病、甲狀腺機能亢進。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 建議在點藥後閉合鼻淚管或輕輕閉上眼睛 2 分鐘。這可以減少點眼藥物經由眼部通道所造成的全身性吸收、因而降低全身性不良反應。
4. 麻醉效果尚未消退前，不建議配戴隱形眼鏡。
5. 本藥可能會讓人視力模糊，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
6. 常見副作用為眼睛疼痛/刺激/腫脹/充血、淚液增加、畏光，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：蕁麻疹、角膜糜爛、角膜混濁、角膜炎。
8. 目前對胎兒的風險不明，因臨床資料不足，懷孕不建議使

臺北市立

聯合醫院

用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。

9. 本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。