



藥物成分

劑型

櫃號

Misoprostol

口服藥

版本：TPE202309 / 檔號：2023-303

☞ 藥品商品名及含量

喜克潰錠 200 微公克/錠 (Cytotec)

☞ 藥品作用

可促進十二指腸潰瘍、胃潰瘍等消化性潰瘍的癒合與症狀的解除。本藥尚有其他臨床用途，請詢問您的醫師或藥師。

☞ 服用方式

1. 治療十二指腸潰瘍、胃潰瘍：一天共服用 4 粒，分 2 次或 4 次於早餐/或每一主餐前以及睡前服用。
2. 預防非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)所導致之消化性潰瘍：每次 1 粒，一天 2 次，一天 3~4 次。視需要可持續治療。使用劑量應依個別病人臨床狀況而定。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，對本品及本品賦形劑、或其他前列腺素過敏者禁服本品。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是含有前列腺素的製劑、含鎂制酸劑、阿斯匹靈或其他止痛藥品。
3. 常見副作用為腹瀉、腹痛、便秘、頭痛、噁心、嘔吐、消化不良，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：月經過多或陰道流血。
5. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。孕婦、未排除懷孕的婦女或準備懷孕的婦女禁止使用本品，因服用期間會增強其子宮張力與收縮力，可能會導致部分

臺北市立

聯合醫院

或全部受孕胎兒的娩出。若在懷孕期間服用本品可能會造成新生兒缺陷。

6. 本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。