



藥物成分	劑型	櫃號
<b>Crotamiton</b>	<b>外用液</b>	

版本：TPE202309／檔號：2023-134

## ☞ 藥品商品名及含量

**悠力素擦液 100 毫克/毫升 (Ulex Lotion 10%)**

## ☞ 藥品作用

濕疹、神經性皮膚炎、蕁麻疹、蚊蟲咬螫、皮膚搔癢症、疥瘡及其它寄生性皮膚感染。

## ☞ 使用方式

每日數回患處塗敷或塗擦。

## ☞ 注意事項

1. 曾因本藥成分引起過敏的人、有滲出性皮膚炎的人，請勿使用。
2. 深部皮膚組織感染、3 歲以下孩童，使用前請洽醫師診治。
3. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦、或要使用於臉部，使用前請先諮詢醫師/藥師。
4. 其他使用上注意事項
  - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (2) 避免陽光直射。
  - (3) 勿超過建議使用量或使用次數。
  - (4) 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
  - (5) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  - (6) 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
  - (7) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
  - (8) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
  - (9) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作



- 用。
- (10) 請勿使用於患部以外，也勿當作預防使用。
  - (11) 本藥不可連續使用超過 7 天。
  - (12) 如有急性皮膚炎症，應於炎症消失後使用。
  - (13) 本劑如使用於幼兒，應避免使用於廣範圍部位。
  - (14) 本劑不可使用於眼科。
  - (15) 本劑如接觸不鏽鋼以外的金屬物(如亞鉛、錫、鋁等)有變質之慮，故勿分裝於金屬製之容器。
  - (16) 使用後請密栓，避高溫保存，特於夏季須保存於陰涼處。
  - (17) 搔癢：本劑須擦於感染部位，一天數次直到搔癢減退。由於本劑對皮膚耐受性良好，對於難治療的病例可作長時間繼續治療，在治療期間不宜沐浴，治療完畢宜徹底沐浴。
  - (18) 疥瘡：病人以溫水沐浴，擦乾皮膚，然後將本劑均勻擦於整個身體表面(臉及頭蓋皮除外)。最好在晚間使用，連續使用 5 天，使用時應特別注意，擦於易受疥蟲感染部位(如指間、腕、腋及生殖器)。被膿皮病感染的部位需以本劑包敷。治療期間病人應避免沐浴，在治療完畢 2~3 天後病人才可沐浴。
  - (19) 治療期間應每天更換床單及內衣。
5. 使用本劑偶有皮膚過敏現象，如有此情況發生，應停止用藥。
  6. 若有上述外之其他不適情況產生，或使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化，請立即停止使用，並接受醫師診治。

## ∞ 藥品儲存

25°C 以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。