



藥物成分	劑型	櫃號
Palbociclib	口服藥	
版本：TPE202309／櫃號：2023-693		

☞ 藥品商品名及含量

愛乳適膠囊 100 毫克/膠囊 (Ibrance Capsules)

☞ 藥品作用

用於治療乳癌。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次 1 粒，建議於用餐時服用。應連續服用 21 天後停止服用 7 天。以 28 天為一個完整的週期。
2. 愛乳適膠囊應整顆吞服，不可咀嚼、咬碎或打開膠囊。
3. **每天應於大約相同的時間服藥**。如果服藥後發生嘔吐情形，當天不可額外再服一劑。如漏服一日藥物，不可隔日服用雙倍劑量，按照平常時間服用一劑即可。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎功能疾病、肺部疾患。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物，特別是抗黴菌與抗病毒藥品。
3. 服藥期間，不應食用葡萄柚、柚子、聖約翰草(St. John's Wort)(或稱金絲桃草)成分及其製品，以免增加身體不適。
4. 由於本品含有乳糖成分。有乳糖不耐症或葡萄糖半乳糖吸收不良的患者不可使用本藥。
5. 若發生口腔潰瘍情形，可在飯後以不含酒精的漱口水漱口，並使用軟毛牙刷維持口腔清潔。
6. 常見副作用為血球數量下降，進而增加疲倦、感染與出血的發生機會。其餘副作用包含：反胃、嘔吐、腹瀉、掉髮、口腔潰瘍、食慾不振、四肢麻木刺痛、流鼻血等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**發燒、寒顫、突然的胸痛、喘不過氣、四肢有紅腫、疼痛情形**。

臺北市立

8. 對胎兒風險不明，資料顯示動物實驗中有生殖毒性，具生育能力患者在治療時應有適當的避孕措施，治療結束後請繼續避孕至少 3 週(女性)或 14 週(男性)，計畫懷孕/已懷孕請告知醫師。本藥可能會分泌到母乳裡，服藥時不應哺乳。