



藥物成分

劑型

櫃號

Amlodipine

口服藥

版本：TPE202309／檔號：2023-519

## ☞ 藥品商品名及含量

得優錠 10 毫克/錠 (DU.Q)

壓可平錠 10 毫克/錠 (Amcopine)

脈優錠 5 毫克/錠 (Norvasc)

諾怡錠 5 毫克/錠 (Nobar)

## ☞ 藥品作用

是一種鈣離子流入抑制劑，可以舒張周邊動脈血管，使周邊血管阻力以及血壓下降，用來治療高血壓及心絞痛。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心衰竭、肝功能不全，以及對 amlodipine 過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他心血管藥物、clarithromycin、cyclosporine、ketoconazole、simvastatin、tacrolimus。
3. 此藥用以治療慢性穩定性心絞痛，不做為急性發作的治療藥物。若胸痛變嚴重或頻率增加時，請告知您的醫師。
4. 服藥期間請避免吃葡萄柚或葡萄柚汁。
5. 常見副作用為頭痛、水腫、眩暈、胃部不適、噁心、極度疲倦、臉部潮紅(感覺發熱)，但一般都不嚴重，若症狀嚴重或持續時請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：血管性水腫(如口腔、眼眶、嘴唇、四肢周圍水腫)、呼吸或吞嚥困難、心悸、心律不整、

臺北市立

聯合醫院

昏厥、紅疹、皮膚或眼睛變黃。

7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。