



藥物成分	劑型	櫃號
Isosorbide-5-Mononitrate	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-248		

☞ 藥品商品名及含量

愛速脈錠 20 毫克/錠 (Isormol)

冠欣錠 20 毫克/錠 (Coxine)

冠欣持續性藥效錠 40 毫克/錠 (Coxine S.R.)

冠欣持續性藥效錠 60 毫克/錠 (Coxine C.R. F.C.)

愛彼脈持續性藥效膜衣錠 60 毫克/錠 (Ibimo C.R.F.C.)

☞ 藥品作用

Isosorbide-5-Mononitrate 可用來預防胸痛(心絞痛)，它的作用是鬆弛分佈至心臟的血管，增加心臟的血液和氧氣供應量。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次 1 粒。
2. 持續性藥效錠需要整顆吞服，不要咀嚼、分開或壓碎錠劑。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是心衰竭、心肌梗塞，或其他心臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)，如血管舒張劑 riociguat、sildenafil、tadalafil, 或 vardenafil。
3. 請勿飲用酒類，酒精會增強此類藥物的作用。
4. 常見副作用為：頭痛、頭暈目眩、噁心嘔吐、姿態性低血壓，但一般都不嚴重，建議可藉著慢慢站立避免發生

危險，若症狀惡化且無法忍受請回診。

5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：嚴重暈眩、嚴重頭痛，嚴重胸痛。
6. 目前對胎兒的風險不明，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師；本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。