



藥物成分	劑型	櫃號
Magnesium Oxide	口服藥	
版本：TPE202309／檔號：2023-285		

☞ 藥品商品名及含量

氧化鎂錠 250 毫克/錠 (Magnesium Oxide)

☞ 藥品作用

軟便。

☞ 服用方式

1. 通常每天口服 2~3 次(早中晚空腹或隨餐),每次 1~2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥,不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥,請立即補服,但若已接近下一次服藥時間,在下次用藥時間服藥即可,不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病,特別是胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有腎臟疾病,特別是正在洗腎。
4. 常見副作用為噁心、嘔吐、嚴重腹痛、發疹,但一般都不嚴重,若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀,請立刻就醫:腹瀉持續不止或更嚴重、血便及自發性腸道出血狀況、使用一星期後無效。
6. 懷孕等級 B,女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。
7. 哺乳期使用本藥對胎兒風險低,有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。